

第9期高齢者保健福祉計画・介護保険事業計画（素案）第1章・第2章修正事項 新旧対照表

| 通番 | 頁数 | ご意見等 | 修正前 | 修正後 |
|----|----|---|---------------------------------|---------------------------------|
| 1 | 14 | <p>【グラフの修正】</p> <p>※グラフの色や太さなど見やすいよう修正する。</p> <p>◇図表19 居住系サービスの受給率（要介護度別）</p> | <p>図表 19 居住系サービスの受給率（要介護度別）</p> | <p>図表 19 居住系サービスの受給率（要介護度別）</p> |



上記グラフに限らず、第1章と第2章のグラフについてはできる限り見やすいよう修正しております。

| 通番 | 頁数 | ご意見等 | 修正前 | 修正後 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|-------|--------------------|---|--|-----|--------------------|-------------------|------|------|------|-----|------|------|------|-------|------|------|------|------|-------|---|------|----------|------|------|------|------|------|--|------|--------------------|-------------------|------|-------|------|------|------|------|----|------|------|------|------|------|-----|------|------|-------|------|------|-----|-----|-----|
| 2 | 16 | <p>【グラフの修正】</p> <p>※第8期と同様に降順記載とする。</p> <p>◇図表21 各リスクの発生状況</p> | <p>図表 21 各リスクの発生状況</p> <table border="1"> <caption>図表 21 各リスクの発生状況 (修正前)</caption> <thead> <tr> <th>リスク</th> <th>発生状況 (%)</th> </tr> </thead> <tbody> <tr><td>運動器</td><td>25.2</td></tr> <tr><td>転倒</td><td>35.7</td></tr> <tr><td>低栄養</td><td>2.6</td></tr> <tr><td>口腔機能</td><td>30.0</td></tr> <tr><td>閉じこもり</td><td>23.9</td></tr> <tr><td>認知機能</td><td>42.9</td></tr> <tr><td>うつ傾向</td><td>44.2</td></tr> </tbody> </table> | リスク | 発生状況 (%) | 運動器 | 25.2 | 転倒 | 35.7 | 低栄養 | 2.6 | 口腔機能 | 30.0 | 閉じこもり | 23.9 | 認知機能 | 42.9 | うつ傾向 | 44.2 | <p>図表 21 各リスクの発生状況</p> <table border="1"> <caption>図表 21 各リスクの発生状況 (修正後)</caption> <thead> <tr> <th>リスク</th> <th>発生状況 (%)</th> </tr> </thead> <tbody> <tr><td>うつ傾向</td><td>44.2</td></tr> <tr><td>認知機能</td><td>42.9</td></tr> <tr><td>転倒</td><td>35.7</td></tr> <tr><td>口腔機能</td><td>30.0</td></tr> <tr><td>運動器</td><td>25.2</td></tr> <tr><td>閉じこもり</td><td>23.9</td></tr> <tr><td>低栄養</td><td>2.6</td></tr> </tbody> </table> | リスク | 発生状況 (%) | うつ傾向 | 44.2 | 認知機能 | 42.9 | 転倒 | 35.7 | 口腔機能 | 30.0 | 運動器 | 25.2 | 閉じこもり | 23.9 | 低栄養 | 2.6 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| リスク | 発生状況 (%) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 運動器 | 25.2 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 転倒 | 35.7 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 低栄養 | 2.6 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 口腔機能 | 30.0 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 閉じこもり | 23.9 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 認知機能 | 42.9 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| うつ傾向 | 44.2 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| リスク | 発生状況 (%) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| うつ傾向 | 44.2 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 認知機能 | 42.9 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 転倒 | 35.7 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 口腔機能 | 30.0 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 運動器 | 25.2 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 閉じこもり | 23.9 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 低栄養 | 2.6 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 3 | 16 | <p>【グラフの修正】</p> <p>※第8期と同様に降順記載とする。</p> <p>◇図表22 各リスクの発生状況 (年齢2区分別)</p> | <p>図表 22 各リスクの発生状況 (年齢2区分別)</p> <table border="1"> <caption>図表 22 各リスクの発生状況 (年齢2区分別) (修正前)</caption> <thead> <tr> <th>リスク</th> <th>65-74歳(計:582人) (%)</th> <th>75歳以上(計:840人) (%)</th> </tr> </thead> <tbody> <tr><td>運動器</td><td>13.1</td><td>33.6</td></tr> <tr><td>転倒</td><td>27.8</td><td>41.1</td></tr> <tr><td>低栄養</td><td>2.1</td><td>3.0</td></tr> <tr><td>口腔機能</td><td>23.9</td><td>34.3</td></tr> <tr><td>閉じこもり</td><td>14.8</td><td>30.1</td></tr> <tr><td>認知機能</td><td>34.0</td><td>48.9</td></tr> <tr><td>うつ傾向</td><td>41.1</td><td>46.2</td></tr> </tbody> </table> | リスク | 65-74歳(計:582人) (%) | 75歳以上(計:840人) (%) | 運動器 | 13.1 | 33.6 | 転倒 | 27.8 | 41.1 | 低栄養 | 2.1 | 3.0 | 口腔機能 | 23.9 | 34.3 | 閉じこもり | 14.8 | 30.1 | 認知機能 | 34.0 | 48.9 | うつ傾向 | 41.1 | 46.2 | <p>図表 22 各リスクの発生状況 (年齢2区分別)</p> <table border="1"> <caption>図表 22 各リスクの発生状況 (年齢2区分別) (修正後)</caption> <thead> <tr> <th>リスク</th> <th>65-74歳(計:582人) (%)</th> <th>75歳以上(計:840人) (%)</th> </tr> </thead> <tbody> <tr><td>うつ傾向</td><td>41.1</td><td>46.2</td></tr> <tr><td>認知機能</td><td>34.0</td><td>48.9</td></tr> <tr><td>転倒</td><td>27.8</td><td>41.1</td></tr> <tr><td>口腔機能</td><td>23.9</td><td>34.3</td></tr> <tr><td>運動器</td><td>13.1</td><td>33.6</td></tr> <tr><td>閉じこもり</td><td>14.8</td><td>30.1</td></tr> <tr><td>低栄養</td><td>2.1</td><td>3.0</td></tr> </tbody> </table> | リスク | 65-74歳(計:582人) (%) | 75歳以上(計:840人) (%) | うつ傾向 | 41.1 | 46.2 | 認知機能 | 34.0 | 48.9 | 転倒 | 27.8 | 41.1 | 口腔機能 | 23.9 | 34.3 | 運動器 | 13.1 | 33.6 | 閉じこもり | 14.8 | 30.1 | 低栄養 | 2.1 | 3.0 |
| リスク | 65-74歳(計:582人) (%) | 75歳以上(計:840人) (%) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 運動器 | 13.1 | 33.6 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 転倒 | 27.8 | 41.1 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 低栄養 | 2.1 | 3.0 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 口腔機能 | 23.9 | 34.3 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 閉じこもり | 14.8 | 30.1 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 認知機能 | 34.0 | 48.9 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| うつ傾向 | 41.1 | 46.2 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| リスク | 65-74歳(計:582人) (%) | 75歳以上(計:840人) (%) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| うつ傾向 | 41.1 | 46.2 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 認知機能 | 34.0 | 48.9 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 転倒 | 27.8 | 41.1 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 口腔機能 | 23.9 | 34.3 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 運動器 | 13.1 | 33.6 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 閉じこもり | 14.8 | 30.1 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 低栄養 | 2.1 | 3.0 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |