

定期予防接種のてびき



* 予防接種を受ける時は、必ず予約をして、母子健康手帳を持参してください。
 予防接種の忘れや、二重接種、間隔誤りなどを防ぐため、母子健康手帳を活用しましょう。

* 予防接種は体調のよいときに受けましょう。

対象期間中は無料で接種できます。

ワクチンの種類		2か月	3か月	5か月	6か月	7か月	1歳	2歳	3歳	4歳	5歳	6歳	7歳	8歳	9歳	10歳	11歳	12歳	13歳	接種方法
五種混合 (ジフテリア、百日せき、破傷風、ポリオ、ヒブ) <small>※不活化ポリオも同スケジュール</small> 不活化ワクチン	●生後2か月から接種しましょう	接種	接種	接種	接種	接種	接種	接種	接種	接種	接種	接種	接種	接種	接種	接種	接種	接種	接種	【1期初回】 20日以上(標準として56日まで)の間隔をおいて3回接種 【1期追加】 初回接種終了後、6か月以上(標準として6か月～1年半に達するまでの期間)の間隔をおいて1回接種 【2期】(二種混合) 小学校5～6年生(11歳になってから)1回接種
小児用肺炎球菌 不活化ワクチン	●生後2か月から接種しましょう。	接種	接種	接種	接種	接種	接種	接種	接種	接種	接種	接種	接種	接種	接種	接種	接種	接種	接種	【初回接種】 2歳に至るまで(標準として1歳に至るまで)に、27日以上の間隔をおいて3回接種 ※2回目の接種が1歳を超えた場合、3回目は接種しない。 【追加接種】 初回接種終了後60日以上の間隔をおいて、1歳に至った日以降(標準として1歳から1歳半に達するまでの間)1回接種
ロタウイルスワクチン ※ R2年10月1日～開始 生ワクチン(経口接種)	ロタリックス ロタテック	接種	接種	接種	接種	接種	接種	接種	接種	接種	接種	接種	接種	接種	接種	接種	接種	接種	接種	◎生後6週0日から生後24週0日まで ※標準的な接種開始時期は生後2か月から ◎生後6週0日から生後32週0日まで ※標準的な接種開始時期は生後2か月から 【初回接種】 どちらのワクチンも生後14週0日までに初回接種を行う。 ロタリックス、27日以上の間隔をおいて2回接種する。生後24週0日までに接種を完了する。 ロタテック、27日以上の間隔をおいて3回接種する。生後32週0日までに接種を完了する。 ※特別な事情がない限り、途中で接種の変更はできない
B型肝炎 不活化ワクチン	●生後2か月から接種しましょう。 ※ H28年10月1日～開始	接種	接種	接種	接種	接種	接種	接種	接種	接種	接種	接種	接種	接種	接種	接種	接種	接種	接種	◎1歳に至るまで(生後2か月から生後9か月に至るまでが望ましい) 27日以上の間隔をおいて2回、1回目の接種から139日以上(20週)おいて1回接種。 ※対象：H28年4月1日以降生まれで、1歳に至るまでの者
BCG(結核) 生ワクチン	●生後5か月から接種しましょう。	接種	接種	接種	接種	接種	接種	接種	接種	接種	接種	接種	接種	接種	接種	接種	接種	接種	接種	◎1歳に至るまで(生後5か月から生後8か月に至るまでが望ましい)
麻疹・風疹混合(MR) 生ワクチン	●1期は、1歳になってから接種しましょう。 ●2期は、年長クラスになってから接種しましょう。	接種	接種	接種	接種	接種	接種	接種	接種	接種	接種	接種	接種	接種	接種	接種	接種	接種	接種	◎1期 1歳から2歳に至るまでの間に1回 ◎2期 5歳以上7歳未満で、小学校入学年度前の1年間(年長組)の間に1回 【1期】1回接種 【2期】1回接種
水痘(水ぼうそう) 生ワクチン	●生後12か月から接種しましょう。	接種	接種	接種	接種	接種	接種	接種	接種	接種	接種	接種	接種	接種	接種	接種	接種	接種	接種	◎3か月以上の間隔をおいて2回接種 (生後12か月から15か月に至るまでに1回、初回接種終了後6か月から12か月に至るまでの間隔をおいて1回接種が望ましい) ◎1歳から3歳に至るまで：3か月以上の間隔をおいて2回接種
日本脳炎 不活化ワクチン	●1期初回は、3歳になってから接種しましょう。	接種	接種	接種	接種	接種	接種	接種	接種	接種	接種	接種	接種	接種	接種	接種	接種	接種	接種	【1期初回】 6日以上(標準として28日まで)の間隔をおいて2回接種 【1期追加】 初回接種終了後6か月以上経過した時期に1回(標準としておおむね1年の間隔) 【2期】 小学校3～4年生(9歳になってから)で1回接種 ※平成19年4月1日までに生まれた人については特例措置があります。 ◎1期初回 生後6か月から7歳半に至るまでの間に2回(3歳が望ましい) ◎1期追加 1期初回終了後、6か月以上たって1回(4歳が望ましい) ◎2期 9歳以上13歳未満に1回(9歳が望ましい)

病後の予防接種について



病後の予防接種は、病気が良くなってから接種しましょう。

●急性感染症
 (風疹、はしか、水痘、おたふくかぜ、など)
 ⇒ 治ゆ後2～4週間後

●ウイルス性疾患
 (突発性発疹、手足口病、など)
 ⇒ 治ゆ後1～2週間後

異なるワクチンの接種間隔について

生ワクチン同士は以下の間隔を空ける必要があります。
 不活化ワクチン同士や、生ワクチンと不活化ワクチンは、間隔をあげる必要はありません。

